

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-5-71 185457

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

Tél. 88.30.34

88.06.15

ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Poste 571

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

25 fr

SUPPLEMENT N° 1 au BULLETIN N° 128 de MAI 1971

LOIRE ATLANTIQUE - MAINE-et-LOIRE - VENDEE.... p. 19

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER - Les projections d'ascospores sont moins nombreuses, mais des taches provoquées par les pluies de la fin Avril, doivent apparaître vers la mi-Mai. La végétation continue de s'accroître. En conséquence:

- dans les vergers de pommiers et de poiriers où un traitement vient d'être exécuté après les récentes pluies, il est inutile d'effectuer une nouvelle application.
- Dans les vergers de pommiers et de poiriers traités conformément aux indications de la note du 3 Mai et où la protection n'a pas été éliminée par les pluies, un nouveau traitement devra être exécuté dans les derniers jours de la semaine en cours.
- Dans les vergers de pommiers et de poiriers traités conformément aux indications de la note du 3 Mai et où la protection a été éliminée par les pluies et n'a pas été renouvelée, il est indispensable d'exécuter une nouvelle application immédiate.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES - Le vol est commencé, mais il est encore beaucoup trop tôt pour intervenir.

OIDIUM DU POMMIER - Les manifestations de cette affection sont nombreuses dans certains vergers. On pourra donc profiter du traitement anti-tavelure pour assurer la protection contre l'oidium en se méfiant des fongicides soufrés qui peuvent provoquer des brûlures par température élevée.

Eliminer les pousses oïdiées.

ARAIGNEE ROUGE - Les éclosions d'oeufs d'hiver sont terminées et les premières pontes d'été sont apparues. Dans les vergers où ce parasite est observé et où il n'a pas encore été combattu, il est indispensable d'ajouter un acaricide, de préférence spécifique, à la bouillie anti-tavelure.

VIGNE

MILDIU - La récente période d'orages a été favorable à la maladie et des foyers primaires peuvent apparaître. Il est donc indispensable d'assurer un bon écoulement de l'eau au cours des périodes pluvieuses et d'éliminer les pousses basses. Il est cependant trop tôt pour intervenir.

VERS DE LA GRAPPE - Le vol est commencé et les premiers oeufs d'Eudémis ont été déposés. Attendre pour intervenir de nouvelles informations de la Station.

OIDIUM - Les premiers germes sont formés sur les cépages sensibles. Il y a donc lieu d'effectuer dès maintenant, en profitant d'une belle journée, un premier traitement contre cette maladie.

CIGARIER - Localement cet insecte pullule et peut nécessiter une intervention qui devra être exécutée dès maintenant avec un insecticide à base d'arséniate de plomb ou de lindane.

.../...

15

.....

ARAIGNEE ROUGE - Les éclosions d'oeufs d'hiver sont également terminées. Les infestations sont très irrégulières, localement fortes, très souvent inexistantes. Les attaques de ce parasite se traduisent par un retard de végétation considérable et très apparent. Les feuilles demeurent petites, recroquevillées, elles sont de couleur grisâtre. A la face inférieure des feuilles, on peut apercevoir de minuscules points rouges. Parfois tous les ceps ne sont pas attaqués dans une même parcelle.

Il appartient donc aux viticulteurs de décider de l'opportunité d'une intervention qui, si elle s'avère nécessaire, devra être exécutée dès réception de cette note.

POMME DE TERRE

MILDIU - Il est encore beaucoup trop tôt pour intervenir.

DORYPHORE - Les premières pontes ont été déposées, mais il est également trop tôt pour combattre cet insecte.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux:

J. DIXMERAS

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 11 MAI 1971